



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**ЭНТЕРУМИН®**

**Регистрационный номер:** ЛСР-004123/09

**Торговое наименование:** ЭНТЕРУМИН®

**Группировочное наименование:** алюминия оксид + углерод

**Лекарственная форма:** порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

**Состав**

**Состав на один пакет:**

*Действующее вещество:*

Алюминия оксид + Углерод (Энтерумин) – 800 мг

**Описание**

Порошок черного цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** энтеросорбирующее средство.

**Код АТХ:** А07ВС

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывает энтеросорбирующее, дезинтоксикационное и противодиарейное действие, обладает высокой адсорбирующей активностью.

Выводит из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) патогенные микробные клетки, эндо- и экзотоксины различного происхождения.

Не вызывает изменений водно-электролитного обмена, но способствует выведению тяжелых металлов. Не поглощает в кишечнике сероводород, необходимый для поддержания нормальной перистальтики. Наиболее эффективен при заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией средне- и высокомолекулярными веществами.

### ***Фармакокинетика***

Не растворяется в воде, спирте и биологических средах, не всасывается, не метаболизируется и выводится через кишечник в течение 24-48 часов.

### **Показания к применению**

- Острые отравления и заболевания, сопровождающиеся эндотоксикозом, с возможным диарейным синдромом: кишечные инфекции; гнойно-септические заболевания; печеночная и/или почечная недостаточность; гепатит; аллергические заболевания; интоксикация на фоне приема антибиотиков широкого спектра действия (антибиотики группы пенициллинов и азалидов, в том числе амоксициллин и азитромицин); нарушения обмена веществ, ожоговая болезнь, абстинентный алкогольный синдром.
- Профилактика похмельного синдрома.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к действующему веществу препарата, кровотечение из желудочно-кишечного тракта (или подозрение на него).

### **Применение во время беременности и в период грудного вскармливания**

Исследований по безопасности и эффективности препарата у беременных и кормящих матерей не проводилось. При необходимости применения препарата во время беременности и в период грудного вскармливания следует проконсультироваться с врачом с целью оценки соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода/грудного ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Принимать внутрь, в смоченном виде, запивая водой, за 1 час до или после еды и приема других лекарственных средств и не менее чем за 2 часа до или после приема антибиотиков.

*Лечение острых отравлений и заболеваний, сопровождающихся эндотоксикозом, с возможным диарейным синдромом (кишечных инфекций, гнойно-септических заболеваний, печеночной и/или почечной недостаточности, гепатита, аллергических*

заболеваний, интоксикаций на фоне приема антибиотиков широкого спектра действия, нарушений обмена веществ, ожоговой болезни, абстинентного алкогольного синдрома):

- взрослым по 3-5 пакетов 2-3 раза в день;
- детям по 1-3 пакета 2-3 раза в день.

Длительность лечения 3-14 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

При острых отравлениях, после промывания желудка: 17-25 г на прием однократно.

*Профилактика похмельного синдрома:* после приема алкоголя в течение одного часа 2-3 пакета однократно.

*Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

#### **Побочное действие**

*Нарушения со стороны иммунной системы:* аллергические реакции.

*Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:* возможны запоры, которые устраняются приемом небольшой дозы слабительного, диетой или снижением дозы препарата с увеличением продолжительности курса.

*Если у вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

#### **Передозировка**

В настоящее время случаи передозировки не зарегистрированы.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат не оказывает влияние на фармакокинетику антибиотиков группы пенициллинов и азалидов при соблюдении способа раздельного по времени приема – не менее 2 часов до и после приема антибиотиков.

Препарат может применяться в комплексной терапии с антибиотиками группы пенициллинов и азалидов, при соблюдении способа применения.

Препарат следует принимать за 1 час до или после приема других лекарственных средств.

#### **Особые указания**

Препарат Энтерумин® окрашивает каловые массы в черный цвет. Хранение препарата на воздухе снижает сорбционную способность.



### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятиям другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

По 800 мг в пакеты из комбинированного материала на основе бумаги, фольги алюминиевой и полиэтиленовой пленки.

6, 10, 12, 18, 20, 24, 30 пакетов с инструкцией по применению в пачку из картона.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Владелец регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

Юридический адрес: 633621,

Новосибирская обл., Сузунский район,

рп. Сузун, ул. Комиссара Зятькова, д. 18.

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95. Интернет: [www.renewal.ru](http://www.renewal.ru)

### **Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей:**

*Производитель*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

*Адрес места производства:*

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80.

*Организация, принимающая претензии от потребителей:*

Акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление»

630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80,

e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)